



TAS *módulo 3* **ALERGIA**

DFEM, 2012, Versão 1

OBJETIVOS

- Definir reação alérgica e anafilaxia
- Caracterizar a abordagem à vítima com reação alérgica



REAÇÃO ALÉRGICA *versus* ANAFILAXIA

Dependendo do alérgeno a resposta do organismo pode ser localizada (ex. picada de melga) ou sistêmica, generalizada a todo o organismo (ex. reação a medicamento como a penicilina).

A reação sistêmica denomina-se de ANAFILAXIA.



ALERGIA/ANAFILAXIA: SINAIS E SINTOMAS

- Hiperemia (ex rubor facial)
- Prurido/urticária
- Aumento das secreções nasais
- Edema da laringe, podendo originar:
 - Dispneia
 - Respiração ruidosa
 - Rouquidão
- EAP
- Sinais de choque: Hipotensão, taquicardia, polipneia
- Pulso arritmico
- Dor pré-cordial
- Náuseas, vômitos e diarreia



ALERGIA/ANAFILAXIA: ATUAÇÃO

- Avaliação ABCDE
- AFASTAR CAUSA PRECIPITANTE!
- Administrar oxigénio
- Vítima em posição confortável
- Avaliar e registar sinais vitais
- CHAMU?
- SE CRITICA INFORMAR CODU





CASO CLÍNICO: ATIVACÃO



ATIVACÃO

Feminino 19 anos, bolhas/flictenas no couro cabeludo

O que lhe diz o cenário?



NO LOCAL

Feminino 19 anos, refere aplicação de coloração para o cabelo ontem, iniciando hoje quadro de bolhas com prurido intenso associado

- **O que sugerem os achados?**
- **Quais as intervenções a adotar?**

A	Permeável
B	FR: 16 SpO2: 99%
C	FC: 100 PA:112/48 mmHg
D	Alerta; Pupilas isocóricas; Sem lateralização da resposta motora Refere prurido intenso no couro cabeludo
E	Apresenta múltiplas flictenas no couro cabeludo com saída de líquido seroso

NO LOCAL

Feminino 19 anos, refere aplicação de coloração para o cabelo ontem, iniciando hoje quadro de bolhas com prurido intenso associado

C	Hoje acordou com quadro de prurido intenso e bolhas no couro cabeludo, está assustada porque parece que está a sangrar
H	Nega
A	Desconhece
M	Nega
U	Há 2 horas

- **Que possibilidades considera agora?**
- **Como abordar?**





SIGA O INEM NO

facebook ↑

www.inem.pt
inem@inem.pt